




# Citronärlan i Sverige och vid Menhammar

Jan Sondell

*Den lyckade häckningen av citronärsla (hanne tillsammans med hona av gulärsla) vid Menhammar motiverar en liten sammanställning av artens uppträdande i landet m m.*

Landets första fynd av citronärsla gjordes så sent som 1972. Sedan 1976 har arten varit årsviss och är alltså på stark frammarsch i Sverige. Fram till och med 1977 har 132 fynd gjorts, år 1998 gjordes 7 fynd, 1999 12 fynd och 2000 18 fynd. I stockholmstrakten har citronärsla tidigare noterats vid Landsort 1997 (2 ex) och 2000, samtliga fåglar var där honor.

Häckfynden är betydligt färre. Någon säker häckning eller försök till häckning har inte konstaterats i Sverige åren 1998-2000. I Finland rapporteras en lyckad häckning 1998 och samma år en misslyckad blandhäckning med gulärsla. Citronärlans utbredning m m framgår av figur 1.



**Figur 1.** Citronärlans utbredning åt väster. Den ljusare rasen Waere finns i sydvästra Ryssland. (Modifierad efter Cramp 1998.)

Den fågel som häckade i Menhammar överensstämmer närmast med kännetecken för rasen waere, som finns i sydvästra Ryssland. Hos rasen citreola är hanen bl a starkare gul-färgad på huvudet. Vår fågel har alltså nått Sverige och Mälardalen via förlängd flyttning från SO – ett klassiskt ursprung för sällsynta fåglar på våren i mellersta Sverige.

Av Mikael Bergmans utmärkta bild på omslaget till Fåglar i Stockholmstrakten 3, 2001 kan man se att citronärlan vid Menhammar är en 2K hanne, som ruggat de flesta, men inte alla armtäckare från ungfågeldräkten.

Källor: Fågelåret 1998 – 2000. Cramp's 1998: The Complete Birds of the Western Palearctic. Oxford University press, CD-ROM.




Foto: Mikael Bergman